

CIDR 1.38g

– dispozitiv pentru aplicare intravaginala la bovine-

Declararea substantelor active si a altor substante

Fiecare dispozitiv contine Progesteron 1.38g consta intr-un elastomer siliconic impregant cu progesteron aplicabil pe o tija de plastic (nylon) .

Forma farmaceutica

Dispozitiv pentru aplicare intravaginala

Dimensiunea ambalajului

Fiecare pachet contine 10 dispozitive.

Specii tinta

Bovine (vacii si juninci)

Indicatii

Pentru controlul estrului la vacii si juninci in perioada estrala, incluzand:

- Sincronizarea estrului in cadrul grupurilor de animale
 - Sincronizarea donatorilor si receptorilor in cazul transferurilor de embrioni
- A se folosi in combinatie cu prostaglandina F2 α sau substante similare.

Utilizarea conform recomandarii duce in mod normal rezulta la aparitia estrului la 48-96 ore dupa scoaterea dispozitivului, majoritatea animalelor prezentand estru in 48-72 ore.

Mod si cale de administrare

1.38 g progesteron per animal timp de 7 zile.

Pentru Sincronizarea Estrului si Sincronizarea Animalelor Donatoare cu cele Receptoare in cazul Transferului de Embrioni.

La animalele ce vor fi tratate se va insera in vagin un dispozitiv pentru fiecare animal. Dispozitivul inserat trebuie mentinut in pozitie timp de 7 zile; cu 24 ore inainte de scoaterea dispozitivului, se va administra o doza de substanta luteolitica, prostaglandina F2 α sau analog. La animalele care raspund la tratament instalarea estrului apare la 1-3 zile de la scoaterea dispozitivului. Vacile trebuie inseminate in 12 ore de la observarea primului estru.

Administrare

Dispozitivul de aplicare trebuie folosit pentru administrare conform procedurii de mai jos:

1. Asigurati-va ca, inainte de aplicare, dispozitivul este curat si inmuiat in solutie antisepetica neiritanta.
2. Purtand manusi de plastic de unica folosinta, indoiti bratele dispozitivului si incarcati aplicatorul. Bratele dispozitivului trebuie sa depaseasca usor aplicatorul. Trebuie avut grija pentru a nu prelungi in mod inutil manipularea si transferul substantei active catre manusile operatorului.
3. Aplicati o cantitate mica de lubrifiant obstetrical la capatul aplicatorului incarcat.
4. Ridicati coada si curatati vulva si perineul.
5. Cu grija, inserati aplicatorul in vagin, intai in directie verticala si apoi in directie orizontala pana intalniti ceva rezistenta.
6. Asigurati-va ca sfoara de eliberare este libera, apasati manerul aplicatorului si permiteti butoiasului sa se miste inapoi catre maner. Acesta elibereaza bratele dispozitivului care va retine apoi dispozitivul in vaginul anterior.
7. Cu dispozitivul pozitionat corect, retrageti aplicatorul, lasand sfoara de eliberare atarnand din vulva.
8. Aplicatorul trebuie curatat si dezinfectat inainte de a fi folosit la alt animal.

Scoaterea

Dispozitivul poate fi scos cu grija, tragand de sfoara. In unele situatii sfoara poate sa nu fie vizibila din exteriorul animalului, in aceste cazuri poate fi localizat in interiorul vaginului cu degetul inmanusat. Retragerea dispozitivului nu necesita forta. Daca se intalneste ceva rezistenta se va folosi mana inmanusata pentru a usura scoaterea dispozitivului.

Daca exista dificultati in scoaterea dispozitivului in partea din spate, trebuie solicitat sfatul medicului veterinar..

Dispozitivul trebuie folosit o singura data.

Timp de asteptare

Carne si organe: 0 zile.

Lapte: 0 zile.

In timpul tratamentului laptele poate fi folosit in consumul uman.

Contraindicatii

A nu se folosi:

- la vacii sau juninci cu tractusuri genitale anormale sau imature, sau la cele cu infectii genitale
- la bovinele gestante
- la mai putin de 35 zile de la fatare

Reactii adverse

S-au evidentiat semne de scurgeri vaginale si iritatie locala ce au fost asociate cu folosirea aplicatorului intravaginal. Aceste scurgeri in general clare, de la scoaterea dispozitivului si pana la inseminare nu afecteaza fertilitatea la inseminarea urmatoare.

Atentionari speciale, dupa caz

Tratamentul numai cu progesteron, in functie de regimul de dozare, nu este suficient pentru a induce estrul si ovulatia la toate femelele in perioada estrala. Este indicat sa se confirme activitatea estrala ovariana inainte de a se utiliza tratamentul cu progesteron.

Poate fi utilizat în perioada de lactație.

Siguranta folosirii produsului medicinal veterinar nu a fost stabilit, de aceea nu il folositi la bovinele gestante sau la mai putin de 35 zile de la fatare. La sobolani si iepuri, dupa injectare intramusculara sau subcutanata a unor doze crescute de progesteron, studiile de laborator au evidentiat efecte fetotoxice.

Trebuie avut in vedere folosirea echipamentului de protectie ce consta in manusi, cand se manipuleaza produsul medicinal veterinar in cursul aplicarii (inseririi) si scoaterii dispozitivului. Inserati dispozitivul folosind aplicatorul.

Mainile si pielea expusa la contact, se va spala cu apa si sapun dupa utilizare.

Nu consumati alimente, lichide si nu fumati in timpul manipularii produsului.

A nu se folosi dupa expirarea datei mentionata pe eticheta.

Conditii de depozitare

Se păstrează sub 30 °C.

Precautii speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deseurilor, dupa caz.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Numai pentru uz veterinar.