

## Berenil<sup>®</sup> Granule

### Soluție injectabilă.

#### Descriere

Berenil<sup>®</sup> granule se prezintă sub forma unui plic ce conține granule de culoare albă.

#### Compoziție

1 ml de soluție reconstituită conține 70 mg diminazen aceturat și 87,3 mg fenildimetil pirazonă (antipyrin).

#### Indicații

La bovine, ovine, cabaline, canide în tratamentul infecțiilor cu Trypanosome (Tr. Congolense, Tr. Vivax și Tr. Brucei); infecții cu Babesii (B. bovis, B. bigemina, B. ovis, B. motasi etc.); infecții mixte cu tripanosome, babesii și în infecții cu forme parazitare rezistente la alte medicamente.

#### Mod de acțiune

Diminazen aceturat este un agent antiinfecțios, folosit în primul rând în tratamentul protozoozelor: Trypanosoma și Babesia. Acționează asupra lor prin legarea ireversibilă de AND și prin blocarea metabolismului glucidic parazit. La babesii acționează prin alterarea funcțiilor membranei celulare.

#### Doze și mod de administrare

Pentru prepararea soluției injectabile se dizolvă un plic de 2,36 g în 12,5 ml apă distilată. Granulele se dizolvă în apă distilată pentru obținerea unei soluții injectabile.

Doza terapeutică este de 3,5 mg/kg greutate vie (5 ml/100 kg.), administrată pe cale intramusculară.

<i>greutate corporală (kg)</i>	<i>soluție injectabilă 7% (ml)</i>
10	0,5 ml
100	5,0 ml
200	10,0 ml
300	15,0 ml
400	20,0 ml
500	25,0 ml

#### Contraindicații

Nu se administrează la cămile.

#### Efecte adverse

Nu se cunosc.

#### Incompatibilități și interacțiuni

Nu sunt.

#### Precauții

Se va folosi instrumentar steril.

#### Perioada de așteptare

Carne: 20 zile;

Lapte: 3 zile.

#### Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

#### Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

#### Prezentare

Plic cu 2,36 g.

#### Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.