

## Chrono-Gest® 45mg

### Bureți intravaginali cu cronolon pentru caprine.

#### Descriere

Chrono-gest® se prezintă sub forma unui burete de culoare albă destinat inserției intravaginale.

#### Compoziție

Fiecare burete conține 45 mg cronolon (fluorogeston acetat).

#### Indicații

Pentru inducerea estrului sincronizat și ovulației la caprine.

#### Mod de acțiune

În vagin, buretele eliberează cronolon (progestagen) care este absorbit. Acțiunea progestativă este comparabilă cu faza luteală a ciclului sexual. Această fază impusă artificial se întrerupe la extragerea buretelui. Injectarea de Folligon (PMSG) în momentul extragerii buretelui, determină un start simultan al fazei foliculare la animalele tratate. Rezultatul constă în dezvoltarea foliculilor, apariția estrului și ovulația.

#### Doze și mod de administrare

Scheme de tratament:

În sezonul de reproducție:

| <b>Tratament de lungă durată</b>   | <b>Tratament de scurtă durată</b>              |
|--|--|
| Ziua 0: introducerea bureților   | Ziua 0: introducerea bureților                 |
|  | Ziua 10: injectarea de Prosolvin 0,5 ml i.m.   |
| Zilele 17-21: extragerea bureților și injectarea de  | Ziua 12: extragerea bureților și injectarea de |
| Folligon (PMSG): 500 U.I. i.m.   |  |
| Monta: după 36 ore de la extragerea bureților; de două ori la interval de 8-12 ore.<br>I.A.: o dată la 36 - 48 ore după extragerea bureților |  |

În extrasezon:

| <b>Tratament de lungă durată</b>   | <b>Tratament de scurtă durată</b>               |
|--|---|
| Ziua 0: introducerea bureților   | Ziua 0: introducerea bureților                  |
| Cu 48 ore înainte de extragerea bureților și   | Ziua 10: injectarea de Prosolvin 0,5 ml i.m. și |
| Injectarea de Folligon (PMSG): 500 - 700 U.I. i.m.   |   |
| Zilele 17-21: extragerea bureților   | Ziua 12: extragerea bureților                   |
| Monta: după 36 ore de la extragerea bureților; de două ori la interval de 8-12 ore.<br>I.A.: o dată la 36 - 48 ore după extragerea bureților |   |

#### Contraindicații

Chrono-gest® nu se utilizează la caprinele sub vârsta de 1 an sau la cele care prezintă scurgeri vaginale. Nu se utilizează mai devreme de 150 zile după fătare.

#### Perioadă de așteptare

Lapte: 0 zile.

Carne: 5 zile.

#### Păstrare

La temperatura camerei 15-20°C și la întuneric.

#### Prezentare

Pungă cu 25 de bureți.

#### Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Bureții se ard după întrebuințare.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.