

COBACTAN[®] 2,5 %

Suspensie injectabilă de cefquinomă.

Descriere

Cobactan® 2,5% se prezintă sub forma unui flacon ce conține o suspensie de culoare albicioasă.

Compoziție

1 ml conține 29,64 mg cefquinomă sulfat (25 mg cefquinomă).

Indicații

În tratamentul infecțiilor aparatului respirator, piodermite, mamite, septicemie la viței, panarițiu, sindromul MMA la suine, actinobaciloză, etc., produse de microorganisme sensibile la cefquinomă, la bovine și suine.

Mod de acțiune

Cefquinona este un antibiotic din grupa cefalosporinelor ce acționează prin inhibarea sintezei peretelui bacterian. Are un spectru larg de acțiune împotriva germenilor G+ și G- și o mare stabilitate în prezența β-lactamazelor. Absorbția cefquinomei se realizează foarte repede, concentrația serică maximă înregistrându-se în 1,5-2 ore de la administrare. Germeți sensibili la cefquinomă: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Haemophilus somnus*, *Serratia marcescens*, *A. pyogenes*, *Bacillus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *E. coli*, *Citrobacter spp.* și *Clostridium spp.*

Doze și mod de administrare

Se administrează intramuscular, timp de 3-5 zile.

Specia	Indicații	Cefquinonă mg/kg gv	Cobactan 2,5%
Bovine, viței	Afecțiuni respiratorii, dermatită digitală, necrobaciloză interdigitală, panarițiu	1 mg	2 ml/50 kg
Vaci lactante	Mastite acute	1 mg	2 ml/50 kg
Viței	Septicemie produsă de <i>E.coli</i> , <i>Salmonella</i>	2 mg	4 ml/50 kg
Suine	Afecțiuni respiratorii	2 mg	4 ml/50 kg
Scroafe	Complexul MMA	2 mg	4 ml/50 kg

Contraindicații

Nu se administrează la animalele sensibile la cefalosporine sau la alte antibiotice β-lactamice.

Efecte secundare

Uneori pot să apară reacții locale tranzitorii.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se cunosc.

Precauții

Persoanele alergice la cefalosporine vor evita contactul cu produsul. Flaconul se agită înainte de utilizare. Se va folosi instrumentar steril.

Perioada de așteptare

Carne: bovine 5 zile; suine 2 zile.

Lapte: 24 ore.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura camerei (15-25 °C) și la întuneric.

Prezentare

Flacon de 100 ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar !