

# Cobactan LC<sup>®</sup>

## Suspensie intramamară.

### Descriere

**Cobactan<sup>®</sup> LC** se prezintă sub forma unei seringi ce conține o suspensie uleioasă pentru administrare intramamară.

### Compoziție

Seringa de 8 g conține 75 mg cefquinomă sulfat.

### Indicații

La vacile în lactație, în tratamentul mastitelor produse de microorganisme sensibile la cefquinomă: *Streptococcus uberi*, *Str. dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*.

### Mod de acțiune

Cefquinoma este un antibiotic din grupa cefalosporinelor și acționează prin inhibarea sintezei peretelui bacterian. Are un spectru larg de acțiune și o mare stabilitate în prezența β-lactamazelor.

### Doze și mod de administrare

- înainte de tratament fiecare sfert se mulge;
- se curăță și se dezinfectează mameloanele;
- se introduce cu atenție conținutul unei seringi în sfertul afectat;
- se injectează lent și se masează mamelonul ușor, de jos în sus, pentru dispersarea ascendentă a suspensiei;
- o seringă este pentru un singur sfert infectat, la interval de 12 ore, timp de 3 mulsori succesive.

### Contraindicații

Nu se administrează la animalele sensibile la cefalosporine sau la alte antibiotice β-lactamice.

### Efecte adverse

Nu sunt.

### Incompatibilități și interacțiuni

Nu se cunosc.

### Precauții

Persoanele alergice la cefalosporine vor evita contactul direct cu produsul.

### Perioada de așteptare

Carne: 2 zile.

Lapte: 7 mulsori.

### Supradozare

Nu este cazul.

### Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

### Prezentare

Cutii cu 15 seringi însoțite de șervete pentru curățarea sferturilor.

### Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.