

# Clamoxyl<sup>®</sup> Metritis

## Suspensie intra-uterină. Amoxicilină sub formă de trihidrat.

### Compoziție

Fiecare aplicator conține:

Amoxicilină (sub formă de trihidrat)	0,800 g;
Excipient uleios q.s.p.	17,800 g.

### Indicații

Pentru bovine, în cazul infecțiilor genitale la vacă, cu germeni sensibili la amoxicilină, mai ales în cazul următoarelor afecțiuni:

- Cervicite,
- Metrite,
- Piometru,
- Endometrite,
- Salpingite.

### Proprietăți

Amoxicilina este o penicilină semisintetică cu spectru larg de activitate având o acțiune bactericidă față de numeroși germeni Gram pozitivi și Gram negativi:

- *Clostridium spp.*,
- *Corynebacterium spp.*,
- *Escherichia coli*,
- *Fusobacterium spp.*,
- *Proteus mirabilis*,
- *Streptococci*,
- *Staphylococci* (sușe sensibile la penicilină).

Utilizarea amoxicilinei sub formă de trihidrat permite menținerea unei activități antibacteriene constante indiferent de variațiile de pH frecvente în cazul infecțiilor tractului genital.

### Calea de administrare

Intra-uterină.

### Administrare

1 seringă per animal pe zi.

Numărul de administrări va fi determinat de către medicul veterinar în funcție de gravitatea cazurilor. 1 până la 2 administrări sunt, în general, suficiente.

### Mod de administrare

1. În cazul piometrului cu prezența de debriduri celulare se va vida cavitatea uterină înainte de administrarea de Clamoxyl Metritis;
2. Se va fixa sonda uterină (pipeta) la seringă (aplicator);
3. Se va conționa colul uterin, de preferință pe cale rectală (cale mult mai ușoară și mai puțin traumatizantă);
4. Sonda (pipeta) va fi introdusă prin mișcări oscilatorii în timp ce colul uterin este menținut ferm. Dacă colul uterin este închis, se va opri introducerea cateterului;
5. Injecții Clamoxyl Metritis.

### Contraindicații

Nu se va administra la animalele care sunt cunoscute ca fiind sensibile la penicilină.

### Perioadă de așteptare

Carne și organe: 24 de ore.

Lapte: 0 zile.

### Depozitare

Într-un loc uscat și răcoros.

Respectați perioada de valabilitate inscripționată pe seringă.

### Prezentare

Seringă de 25 ml cu sau fără cateter.

Cutii cu 12 seringi de 25 ml și cu 12 catetere intra-uterine.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !