

Dexadreson[®]

Soluție injectabilă de dexametazonă.

Descriere

Dexadreson se prezintă sub forma unui flacon ce conține o soluție injectabilă limpede și transparentă.

Compoziție

1 ml conține 2 mg dexametazonă ca ester fosfat disodic.

Indicații

Valoarea terapeutică a **Dexadreson** constă în: acțiune antiinflamatorie, acțiune antialergică, acțiune antișoc, acțiune neoglucogenică (în cetoza primară), posibilitatea inducerii parturii la rumegătoare.

Mod de acțiune

Dexadreson este un corticosteroid foarte puternic (cu activitate de cel puțin 30 de ori mai mare decât cortizonul).

Doze și mod de administrare

<i>Specia</i>	<i>Dozare</i>	
	<i>Locală(i.a.) înfuncțiede talia animalului</i>	<i>Sistemică(i.m.)</i>
Cabaline, bovine, scroafe	1-5 ml / animal (2-10 mg)	0,06 mg/kg
Mânz,vițel,porc, oaie,capra	1-2,5 ml / animal (2-5 mg)	0,06 mg/kg
Căine,pisică	0,125-2,5 ml / animal (0,25-5 mg)	0,1 mg/kg

Se administrează prin injecție intravenoasă, intramusculară sau intraarticulară. Tratamentul poate fi repetat după 24 – 48 de ore. Când tratamentul se prelungește, scăderea dozelor trebuie să se facă gradat, recomandându-se o stimulare concomitentă a glandelor suprarenale cu ACTH. Toate injecțiile intraarticulare trebuie precedate de extragerea unui volum de lichid sinovial egal cu cel care se va administra.

În șoc, se poate administra intravenos, doza fiind de cel puțin 10 ori mai mare decât doza recomandată pentru administrarea intramusculară.

Contraindicații

Nu se administrează în caz de: diabet zaharat, afecțiuni renale, congestie cardiacă și osteoporoză. Este contraindicat în combinație cu vaccinuri. Are efect imunosupresor. Este contraindicat în cursul gestației avansate (excepție făcând parturiția precoce sau avortul impus).

Efecte adverse

Retenția sodiului și pierderea potasiului sunt neglijabile.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se administrează în combinație cu vaccinuri (efect imunosupresiv).

Precauții

În cazul bolilor infecțioase, corticoterapia trebuie însoțită obligatoriu de un tratament cu antibiotice. În cazuri de laminită la cai, Dexadreson trebuie folosit numai în faza incipientă a afecțiunii. Pentru obținerea unui răspuns rapid în cazul reacțiilor acute de hipersensibilitate și în stările anafilactice poate fi necesară administrarea de antihistaminice și/sau adrenalină, împreună cu corticosteroidul.

Perioada de așteptare

Lapte: 36 ore.

Carne: 2 zile.

Supradozare

Se va evita supradozarea.

Păstrare

La temperatura camerei (15 – 25°C) și la întuneric.

Prezentare

Flacoane de 50 ml și 20 ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.