

Eurofit gel

infuzie intramamară pentru bovine

Recomandări

Ca terapie complementară în mastite și mamite acute și subacute, pentru reducerea numerică a celulelor somatice din lapte, în cazul secrețiilor lactate sangvinolente după parturitie. În cazuri grave este recomandată suplimentarea terapiei cu antibiotice. Determină o vindecare mai rapidă.

Modul de administrare

Intramamar.

Compoziția cantitativă și calitativă

Phytolaca decandra 30 CH, *Hepat sulfur* 30 CH, Bioxide de siliciu 30 Ch, *Sepia officinalis* 30 Ch, *Thuya occidentalis* 30 Ch, Calcarea phosphorica 30 CH, Pulsatilla 30 CH, Iod 30 CH, Cantharis 9 CH, Fosfor 9 CH, *Baptisia tinctoria* 9 CH, *Echinacea angustiphola* 9 CH, Acid azotic 9 CH, *Phellendrium aquaticum* 9 CH, *Arnica montana* 9 CH, Bryonia 9 CH, Alginat de sodiu 8g, Apă 1000 ml.

Specii țintă

Bovine.

Supradozarea

Nu este cazul

Timp de așteptare

Nu este cazul. Laptele mamitic este interzis pentru consumul uman.

Mod de administrare și doză

Se administrează intramamar. O seringă în fiecare sfert afectat după muls (dimineața și seara), timp de 2- 3 zile. NOTĂ în caz de mastită cu evoluție gravă se recomandă ca Eurofit să se utilizeze împreună cu un antibiotic eficace.

Efecte adverse

Nu se cunosc.

Interacțiuni cu alte medicamente

Nu au fost observate interacțiuni cu alte medicamente, la aplicarea antibioticului (ales pe baza rezultatelor antibiogramei) împreună cu Eurofit sol crește rapid eficacitatea efectului terapeutic.

Precauții speciale

Uneori în decurs de 2-3 ore după administrarea intramamră a medicamentului poate crească temperatura glandei mamare. Această stare este însoțită de o inflamare a glandei mamare, iar simptomele sunt mult mai evidente în formele mai grave (mastită acută). Aceste simptome se remit după 4-7 ore de la aplicarea tratamentului, iar în unele cazuri de mastită acută temperatura crescută și inflamația ugerului poate să dureze chiar până la următoarea administrare de medicament. Aceste simptome sunt trecătoare și sunt în legătură cu mecanismul de acțiune al tratamentului homeopat.

Caracteristici farmaceutice

Valabilitate 10 luni.

Valabilitatea după prima deschidere: se utilizează în limita valabilității înscrise pe ambalaj.

Prezentare

Ambalaj unic, seringă x 30 ml, 60 seringi x 30 ml.

Depozitare

La o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C. Ferit de lumină și de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Producător

Slovenska Zooveterinarina Homeopaticka Spolocnost s.r.o.