

GEL-LYTE Plus

**Conține glutamină.
Stabilizarea apei și a balanței electrolite.
Menține balanța acidică/bazică.**

Descriere

Hrană dietetică complementară.

Utilizare

Gel-Lyte Plus este indicat pentru viței. În caz de risc de, în timpul perioadelor de sau în caz de recuperare după dereglări digestive (diaree). A se apela la sfatul medicului veterinar înainte de utilizare. Dietetic.

Compoziție

Glucoză, citrat de sodiu, propionat de sodiu, acetat de sodiu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, glutamină-L.

Per litru:

Sodiu.....	106g
Potasiu.....	39.0g
Clorură.....	71.0g
Precursor de bicarbonat.....	332g
Glutamină-L.....	29.2g
Glucoză.....	200g

Soluția reconstituită (25 ml/l în apă/lapte) furnizează:

Sodiu.....	2650 mg/l
Potasiu.....	975 mg/l
Clorură.....	1775 mg/l
Precursor de bicarbonat.....	8300 mg/l
Glucoză.....	5000 mg/l

Administrare

Gel-Lyte Plus este destinat numai pentru administrare orală. A se agita bine înainte de utilizare.

Preparați o soluție proaspătă înainte de fiecare administrare.

Înlăturați capacul și strângeți sticla până la nivelul 25 ml din vârf. Amestecați 25 ml cu 1 l de lapte cald sau apă. Pentru a menține nivelul electroliților administrați 2 l de lapte (sau apă) conținând Gel-Lyte Plus, de două ori pe zi, timp de 2 zile sau până la 7 zile (cu lapte), dacă este necesar.

Proprietăți

Modul de utilizare a **Gel-Lyte Plus** este foarte practic și poate fi diluat în lapte sau apă. Compusă din agenți de alcalizare, electroliți și energie, formula are o palatabilitate optimă care facilitează consumul de lapte sau apă. Gel-Lyte Plus poate fi utilizat fără întreruperea alăptării.

Perioada de așteptare

Nu există.

Perioada de valabilitate

1 an.

Evacuați recipientul gol în gunoiul menajer.

A se păstra la loc uscat, la temperaturi mai mici de 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ManA 2000

Producător

Norbrook Laboratories Limited
Newry, Co. Down, Northern Ireland.

Numai pentru uz veterinar !