

Hostacortin[®] H

Suspensie cristalină de prednisolon.

Descriere

Hostacortin[®] H se prezintă sub forma unui flacon ce conține o suspensie cristalină, injectabilă, albicioasă.

Compoziție

1 ml conține 10 mg prednisolon acetat.

Indicații

La bovine, cabaline, suine, ovine, caprine, canide și feline în:

A) tratament sistemic:

- tulburări metabolice de tipul acetonemiei, cetozei, tetaniei, parezilor;
- creșterea apetitului în cazuri de debilitate generală și de epuizare (de asemenea în cazul animalelor în convalescență);
- stări de șoc pre și post operatorii;
- lumbago, intoxicații, alergii, hiperergii, urticarie, prurit, arsuri chimice sau termice, arsuri prin insolajie, reumatism, edem pulmonar, emfizem pulmonar, eczeme, otite, înțepături de insecte și mușcături de șerpi.

B) tratament local:

- inflamația aseptică a membranelor articulare sau sinoviale și a burselor, artrite, artroze, tendinite, luxații, entorse;
- profilaxia aderențelor abdominale post-operatorii.

Mod de acțiune

Preparat injectabil pe bază de prednisolon, pentru tratamentul specific sau de susținere, local sau sistemic, în afecțiuni inflamatorii, hiperergice, toxice sau proliferative, sau pentru terapia infecțiilor și a tulburărilor metabolice.

Doze și mod de administrare

A) tratament sistemic

<i>Specie</i>	<i>Doza (ml)</i>	<i>Doza (mg)</i>	<i>Mod de administrare</i>
Cabaline, bovine	10 – 20	100 – 200	i.m. profund , 2-4 ori la interval de 24 ore
Viței, ovine, caprine, suine	2,5 - 5	20 – 50	i.m. profund , 2-4 ori la interval de 24 ore
Canide, feline, porci	1 – 3	10 – 30	i.m. profund , 2-4 ori la interval de 24 ore

B) tratament local

<i>Specie</i>	<i>Doza (ml)</i>	<i>Doza (mg)</i>	<i>Mod de administrare</i>
Animale mari	2,5 - 7,5	25 – 75	intraarticulară, intratendovaginală
Animale mari	1,0 – 5,0	10 – 50	intrabursală
Cabaline, bovine	10 – 20	100 – 200	intraabdominală
Viței, ovine, caprine, suine	2,5 - 5	20 – 50	intraabdominală
Canide, feline, porci	1 – 3	10 – 30	intraabdominală
Canide, feline	0,5 – 2,0	10 – 50	intraarticulară, intratendovaginală

Contraindicații

Nu se administrează în caz de: diabet zaharat, osteoporoză și tuberculoză acută. Nu se injectează în țesutul infectat.

Efecte adverse

Dacă se administrează vacilor gestante (începând cu luna a treia), corticosteroizii pot provoca avorturi sau nașteri premature cu retenția placentei.

Incompatibilități și interacțiuni

Când se utilizează pentru tratamentul bolilor infecțioase trebuie administrat numai simultan cu antibiotice sau chimioterapie.

Precauții

Flaconul se agită înainte de utilizare. Se va folosi instrumentar steril.

Perioada de așteptare

Carne:

bovine, cabaline, ovine, caprine: 8 zile

suine: 6 zile

Lapte: 1 zi

Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

Prezentare

Flacon de 50 ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.