

Ivotan® premix

Antiparazitar intern și extern.

Descriere

Ivotan® Premix se prezintă sub forma unui sac ce conține o pulbere de culoare galbenă.

Compoziție

100 g conțin: ivermectină 4,0 g,
Excipient 100,0 g.

Mod de acțiune

Ivermectina acționează asupra sistemului nervos al nematodelor și artropodelor parazite provocând paralizia și moartea acestora; stimulează producerea acidului gamaaminobutiric (GABA) la nivelul sinapselor și întrerupe transmiterea influxului nervos. Ivermectina nu acționează asupra sistemului nervos de la mamifere, respectiv nu influențează acetilcolina-principal mediator al influxului nervos.

Indicații

Tratamentul și controlul eficace al diferitelor specii de paraziți gastrointestinali, pulmonari, renali, ai pielii, acarieni, agenții miazelor etc., la ovine, ovine, caprine și suine.

Suine:

Nematode gastrointestinale: *Oesophagostomum spp.* (forme adulte și stadiile larvare L4), *Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus*;

Viermi renali: *Stephanurus dentatus* (forme adulte, stadiile larvare L4);

Viermi pulmonari: *Metastrongylus spp.* (forme adulte);

Păduchi hemofagi: *Haematopinus suis*;

Râie: *Sarcoptes scabiei var. suis*;

Bovine:

Nematode gastrointestinale: *Oestertagia ostertagi* (forme adulte, L3 și L4 inclusiv larvele inhibate), *Oestertagia lyrata* (forme adulte și L4), *Cooperia oncophora* (forme adulte și L4), *Trichostrongylus colubriformis* (forme adulte și L4), *Cooperia spp.* (L3), *Cooperia punctata* (forme adulte și L4), *Cooperia pectinata* (forme adulte și L4), *Bunostomum phlebotomum* (forme adulte, L3 și L4), *Nematodirus helvetianus* (forme adulte), *Nematodirus spathiger* (forme adulte), *Strongyloides papillosus* (forme adulte), *Toxocara vitulorum* (forme adulte), *Trichuris spp.* (forme adulte);

Nematode pulmonare: *Dictyocaulus viviparus* (forme adulte, L4 și stadiile larvare inhibate);

Miaze produse de: *Dermatobia hominis* (larve);

Păduchi hematofagi: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*;

Ovine:

Nematode gastrointestinale: *Haemonchus contortus*, *Haemonchus Placei* (forme adulte), *Oestertagia circumcincta* (forme adulte, L3 și larvele hipobiotice), *Trichuris ovis* (L3), *Cooperia oncophora* (forme adulte), *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus columbriformis* (forme adulte și L3), *Nematodirus spathiger* (L3), *Strongyloides papillosus* (L3), *Gaigeria Pachyscelis* (L3), *Oesophagostomum columbianum* (L3), *Oesophagostomum venulosum* (forme adulte) și *Chabertia ovina* (L3);

Nematode pulmonare: *Dictyocaulus filaria* (forme adulte, stadiile larvare L3 și L4);

Parazit cranian: *Oestru ovis* (larve);

Acarieni: *Psoroptes communis ovis*;

Caprine: Nematode gastrointestinale: *Haemonchus contortus*, *Oestertagia circumcincta*, *Trichostrongylus columbriformis*, *Nematodirus spathiger*, *Chabertia ovina* (forme adulte), *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum*;

Nematode pulmonare: *Dictyocaulus filaria*;

Doze și mod de administrare

Suine:

Se administrează pe cale orală în rația de bază în două moduri:

- tratament de 7 zile 16 g/640 kg g.v. (100 µg ivermectină/kg g. V.)
- tratament de 1 zi 16 g/128 kg g.v. (500 µg ivermectină/kg g. V.)

Purcei		
Greutatea corporală medie (kg)	Ivotan Premix (g/tona/furaj) – 7 zile	Ivotan Premix (g/tona/furaj) – 1 zi
Până la 39	500 g/zi	2500 g
40 – 69	600 g/zi	3000 g
70 – 100	675 g/zi	3375 g

Reproducători				
Greutatea corporală media (kg)	Ratia (kg/zi)	Ivotan Premix (g/tona/furaj) – 7 zile	Reproducători tratați/tona/furaj 1 zi	Ivotan Premix (g/tona/furaj) – 1 zi
200	2,0	2.500	71,4	12.500
250	2,0	3.125	71,4	15.625
300	2,0	3.750	71,4	18.750
200	2,5	2.000	57,1	10.000
250	2,5	2.500	57,1	12.500
300	2,5	3.000	57,1	15.000
200	3,0	1.666	47,6	8.330
250	3,0	2.083	47,6	10.415
300	3,0	2.500	47,6	12.500

Bovine, ovine, caprine:

Se administrează pe cale orală în rația de bază (tărâțe sau porumb). Doza este de 200 µg/kg g.v., o singură doză. 1 g (lingură) asigură doza necesară pentru tratamentul a 20 kg g.v./animal.

Contraindicații

Nu se administrează femelelor în lactație.

Efecte adverse

Nu sunt.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu sunt.

Precauții

În timpul manipulării este interzis fumatul. După utilizare spălați bine mâinile.

Perioada de așteptare

Carne: 5 zile.

Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

Prezentare

Cutie de plastic de 5 kg.

Precauții pt. produsul neîntrebuințat și ambalaje

După întrebuințare ambalajele se distrug prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.