

Nobilis[®] CAV P4

Vaccin viu, atenuat contra anemiei infecțioase a puilor.

Descriere

Nobilis[®] CAV P4 se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă albă, liofilizată. Se folosește cu diluant:

- Dilavia (administrare s.c.);
- Unisolve (administrare prin metoda Stick, transcutanată).

Compoziție

Nobilis[®] CAV P4 este un vaccin viu, atenuat împotriva anemiei puilor. Fiecare doză conține minimum 3,0 log₁₀ TCID₅₀ din virusul anemiei infecțioase a puilor tulpina 26 P4, cultivat pe ouă embrionate. Pastila de virus liofilizat conține stabilizator.

Indicații

Imunizarea tineretului de reproducție sau selecție față de virusul anemiei infecțioase a puilor.

Mod de acțiune

Tulpina P4 este sigură când se administrează la vârste mai mari de 6 săptămâni. Imunitatea dobândită se va transmite la progeni.

Doze și mod de administrare

Inoculare i.m. sau s.c.

Se reconstituie vaccinul cu diluant Dilavia, 200 ml la 1.000 doze. Se inoculează 0,2 ml vaccin i.m. sau s.c. *Metoda STICK* (străpungerea pliului pielii aripii în unghiul humero-radio-cubital) transcutanată. Se reconstituie vaccinul folosind diluantul Intervet Unisolve, 13 ml pentru 1.000 doze. Dispozitivul de vaccinat (ace duble) se cufundă în flaconul cu vaccin reconstituit (se asigură că ambele orificii ale acelor s-au încărcat cu vaccin) și se străpunge pliul pielii.

Program de vaccinare:

Timul optim de vaccinare și metoda de administrare depind de situația epidemiologică locală. Se va consulta medicul veterinar. Vaccinarea efectivelor de reproducție se face cu cel puțin 6 săptămâni înainte de intrarea în ouat, asigurându-se astfel transmiterea unui titru bun de anticorpi la progeni.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave și puii mai mici de 6 săptămâni.

Efecte adverse

Durata și intensitatea reacțiilor postvaccinale depind de starea de sănătate și de întreținere a păsărilor.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu sunt.

Vaccinarea cu vaccinul **Nobilis[®] CAV P4** poate fi efectuată simultan cu vaccinul Nobilis Reo (i.m. sau s.c.) sau cu vaccinul Nobilis[®] Ovo-Diphtherin (metoda Stick).

Precauții

Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile;
Ouă: 0 zile.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2-8°C și la întuneric.

Prezentare

Vaccin: flacon x 1000 dz.

Diluant: Dilavia – flacon de 200 ml;
Unisolve – flacon de 13 ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.
Numai pentru uz veterinar.