

## Nobilis<sup>®</sup> Gumboro 228 E

### Vaccin viu, liofilizat antibursitic.

#### Descriere

**Nobilis<sup>®</sup> Gumboro 228 E** se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată de culoare alb-gălbuie.

#### Compoziție

Fiecare doză conține  $\geq 2,0 \log_{10}$  EID<sub>50</sub> din tulpina intermediară 228 E de virus Gumboro (B.I.A. – bursită infecțioasă aviară).

#### Indicații

Imunizarea activă a puilor față de virusul B.I.A. (Gumboro).

#### Mod de acțiune

Tulpina vaccinală 228 E este cea mai puțin atenuată tulpină intermediară de virus B.I.A. Ca urmare, virusul are proprietatea de a rezista în prezența anticorpilor maternali și de a se răspândi mai bine în efectivele vaccinate. Imunitatea se instalează în cca. 2 săptămâni de la vaccinare.

#### Doze și mod de administrare

Prin apa de băut, oculo-nazal sau prin aerosoli. Flacoanele de 1000 de doze sunt pentru 1000 de păsări.

##### *Program de vaccinare:*

Vârstele la care puii pot fi vaccinați depind de nivelul anticorpilor maternali și de aceea vaccinarea se face în funcție de categoria puiului și de modul cum au fost vaccinate efectivele de reproducție.

*Broilerii* proveniți din părinți vaccinați numai cu vaccinuri vii B.I.A. pot fi vaccinați la vârsta de 7-14 zile.

*Broilerii* proveniți din părinți vaccinați cu vaccinuri B.I.A. inactivate pot fi vaccinați la vârsta de 14-17 zile.

*Tineretul de înlocuire* provenit din părinți vaccinați numai cu vaccinuri vii B.I.A. poate fi vaccinat la vârsta de 14-21 zile.

*Tineretul de înlocuire* provenit din părinți vaccinați cu vaccinuri B.I.A. inactivate poate fi vaccinat la vârsta de 21-28 zile.

Schemele de mai sus se bazează pe evoluția curbei de anticorpi maternali care descrește mai repede sau mai lent în funcție de nivelul transmis de părinți.

#### Imunizare

Durata și nivelul imunității depind de vârsta puilor, starea de sănătate și de întreținere a lor. Condițiile de igienă și respectarea condițiilor de creștere pot influența instalarea imunității.

#### Contraindicații

Nu se vaccinează puii bolnavi.

#### Efecte adverse

Durata și intensitatea reacțiilor postvaccinale depind de starea de sănătate și de întreținere a păsărilor.

#### Incompatibilități și interacțiuni

Între două vaccinări succesive cu vaccinuri diferite trebuie să existe un interval de cel puțin 7 zile.

#### Precauții

Se va folosi instrumentar steril. Spălați și dezinfecțați mâinile înainte și după vaccinare.

#### Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

#### Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

#### Păstrare

La temperatura de 2-8°C și la întuneric.

#### Prezentare

Cutie cu 10 fl. x 1.000 dz. sau 2.500 dz.

#### Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.