

Nobilis[®] IB + ND

Vaccin mixt inactivat antibronșitic și antipseudopestos.

Descriere

Nobilis[®] IB+ND se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid uleios, omogen, de culoare albă, cu seringibilitate bună.

Compoziție

Conține tulpinile imunogene ale virusurilor:

- bronșitic (serotipul Massachusetts 41 cu $\geq 6,0 \log_2$ unități IH);
- pseudopestos (tulpina lentogenă Clona 30 cu ≥ 50 unități PD₅₀);

Virusurile sunt inactivate cu formol și emulsionate cu un adjuvant uleios.

Indicații

Vaccinarea de întărire, la găinile ouătoare și de reproducție sănătoase, în scopul protejării lor contra virusului Newcastle și tipului Massachusetts de B.I. Se asigură imunitate pe toată perioada ouatului.

În zonele în care serotipurile variante de B.I. nu sunt prezente, se poate folosi vaccin Nobilis[®] cu tulpină clonată Ma 5.

Mod de acțiune

Vaccinul imunizează reproducătorii și ouătoarele față de: serotipul Massachusetts al virusului B.I. și virusul Newcastle. Imunitatea pentru cele două virusuri durează toată perioada de ouat.

Doze și mod de administrare

Fiecare pasăre se vaccinează intramuscular (în piept sau picior) sau subcutanat (pe fața dorsală a gâtului) cu 0,5 ml vaccin.

Program de vaccinare:

Nobilis[®] IB + ND se administrează păsărilor începând cu vârsta de 16 - 20 săptămâni. Vârsta maximă este cu 4 săptămâni înainte de începerea ouatului. Înainte de administrarea vaccinurilor inactivate, sistemul imunitar al păsărilor trebuie pregătit în mod adecvat, cu vaccinuri vii contra fiecărui virus component. Efectul imun cel mai bun se obține când intervalul dintre vaccinarea cu virus viu și cea cu virus inactivat este mai mare de 6 săptămâni. Intervalul minim dintre vaccinarea primară cu virus viu și cea cu vaccin inactivat este de 4 săptămâni.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară un mic nodul care se resoarbe în timp.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Nu s-au observat interacțiuni la vaccinarea simultană cu alte vaccinuri Intervet inactivate.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei și se va agita pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Ouă: 0 zile.

Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C și la întuneric.

Prezentare

Flacon de 500 ml (1000 doze).

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.