

Nobilis[®] MG 6/85

Vaccin viu, liofilizat împotriva *Mycoplasma gallisepticum*.

Descriere

Nobilis[®] MG 6/85 se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată de culoare alb-gălbui.

Compoziție

Vaccinul conține tulpina stabilă Intervet 6/85 de *Mycoplasma gallisepticum*, apatogenă pentru puii de găină și curcă. O doză conține 10^{6,9} CFU.

Indicații

Vaccinul se recomandă pentru imunizarea puilor viitoarelor ouătoare împotriva micoplasmozei aviare.

Mod de acțiune

Imunizarea activă a efectivelor de reproducție și găini ouătoare, pentru reducerea semnelor clinice determinate de tulpina sălbatică de *Mycoplasma gallisepticum*.

Doze și mod de administrare

Nobilis[®] MG 6/85 se poate administra începând cu vârsta de 6 săptămâni, prin metoda spray (aerosoli). Fiecare pasăre se vaccinează cu o singură doză de vaccin. Flacoanele de 1000 de doze sunt pentru 1000 de păsări. Se vaccinează toți puii în același timp. În situații endemice se poate vaccina la 4 săptămâni.

Metoda cu aerosoli:

Se dizolvă vaccinul în apă rece (apa va avea caracteristicile apei potabile). Flaconul cu vaccin se deschide sub apă. Aparatul folosit pentru vaccinare trebuie să fie curat și fără urme de dezinfectant. Vaccinul reconstituit va fi introdus în aparatul de aerosoli și va fi pulverizat deasupra păsărilor de la o distanță de 30 – 40 cm. Dimensiunea particulelor de aerosoli trebuie să fie de aprox. 20 μm. Înainte de vaccinare vor fi închise toate fantele de aerisire și va fi oprită ventilația. Volumul de apă folosit pentru vaccinare este 400 ml pentru 1000 doze.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave. Vaccinul nu se administrează cu 4 săptămâni înainte de începerea ouatului, în timpul ouatului sau cu 3 săptămâni înainte de tăiere. Nu se folosesc antibiotice/chimioterapice 5 zile înainte și după vaccinare.

Efecte adverse

Durata și intensitatea reacțiilor postvaccinale depind de starea de sănătate și întreținere a efectivelor precum și de administrarea corectă a vaccinului.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe. Vaccinul **Nobilis[®] MG 6/85** nu se administrează timp de 14 zile de la vaccinarea cu alte vaccinuri vii.

Precauții

La diluția vaccinului se va folosi apă fără clor sau dezinfectante (se preferă apa distilată). Mărimea particulelor de aerosoli va fi mai mică de 20 microni. În timpul vaccinării se vor evita curenții de aer iar operatorii vor purta mască de protecție. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare. Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Ouă: 0 zile.

Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Cutii cu 10 fl. x 1000 dz.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.