

Nobivac[®] Pigeon POX

Vaccin viu, atenuat contra variolei porumbeilor.

Descriere

Nobivac[®] Pigeon Pox se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă albă, liofilizată însoțită de un flacon cu diluant. Vaccinul se livrează împreună cu o perie aplicatoare.

Compoziție

Fiecare doză conține cel puțin 3,9 log₁₀ EID₅₀ de virus Pox, tulpina Peristerin.

Indicații

În scopul prevenirii variolei la porumbei.

Mod de acțiune

Această tulpină induce un nivel ridicat al imunității în (diftero)variola porumbeilor.

Doze și mod de administrare

Se vaccinează numai porumbeii mai mari de 5 săptămâni. Se recomandă vaccinarea anuală a întregului efectiv, dar dacă există pericol de infecție, porumbeii pot fi revaccinați oricând.

Înainte de utilizare vaccinul se reconstituie cu diluantul. Pentru aceasta vaccinul și diluantul se livrează împreună cu un tub conector prin intermediul căruia diluantul se trece în flaconul cu vaccin. Pentru dizolvarea completă a pastilei liofilizate, soluția se trece de mai multe ori dintr-un flacon în celălalt.

Păsările se vaccinează pe picior sau în zona pieptului. Se smulg cu grijă câteva pene pentru a se descoperi câțiva foliculi plumiferi. Cu ajutorul periei aplicatoare înmuiate în vaccin se perie într-un singur sens locul ales pentru vaccinare. Peria se va încălzi cu vaccin înainte de vaccinarea fiecărei păsări.

Dacă variola este diagnosticată într-un efectiv, păsările aparent sănătoase vor fi vaccinate imediat și separate de păsările bolnave. Păsările care nu erau în perioada de incubație în momentul vaccinării își vor consolida imunitatea.

În cazul unor infecții cu tulpini foarte virulente, pot fi găsite leziuni superficiale ușoare și la păsările vaccinate, dar acestea nu vor face forma generalizată de boală.

Contraindicații

Se vaccinează numai păsările sănătoase. Nu se recomandă la găini.

Efecte adverse

Nu sunt.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu sunt.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei. Flaconul se agită pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril. În cazuri accidentale, când deplumarea a provocat sângerare, se va alege alt loc pentru aplicarea vaccinului. Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare.

Perioadă de așteptare

Carne: 0 zile.

Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Cutie cu 1 fl. x 50 dz. însoțit de diluant x 4 ml și periuță.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.