

Nobivac[®] Rabies

Vaccin antirabic.

Descriere

Nobivac[®] Rabies se prezinta sub forma unui flacon ce contine o solutie limpede de culoare rosie.

Compoziție

Nobivac[®] Rabies conține o cultură inactivată de virus rabic clonat din tulpina Pasteur RIV (virus rabic infecțios). Virusul este cultivat pe linia celulară clonată BHK 21, este inactivat cu betapropiolactonă și adsorbit pe fosfat de aluminiu.

Indicații

Pentru imunizarea activă a caninelor, felinelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, dihorilor, vulpilor, ecvinelor etc.

Mod de acțiune

Componenta activă, pe doză, o constituie tulpina rabică Pasteur RIV, care induce cel puțin 2 U.I. la testul de potență. Vaccinul asigură un nivel înalt de anticorpi după 3 săptămâni de la administrare. După această perioadă se păstrează un nivel de anticorpi mai mult sau mai puțin constant, dar suficient de ridicat pentru asigurarea protecției.

Doze și mod de administrare

Fiecare animal se vaccinează subcutanat sau intramuscular cu 1 ml (1 doză) vaccin.

Schema de vaccinare recomandată:

	câini, pisici	vulpi, dihori	bovine, cabaline	ovine, caprine
Prima vaccinare la vârsta de peste:	3 luni *	3 luni *	6 luni *	6 luni *
Revaccinări la fiecare:	1 an	1 an **	2 ani	1 an
Calea de administrare	i.m. sau s.c.	s.c.	i.m.	s.c.

* Prima vaccinare poate fi aplicată la o vârstă mai mică dar atunci trebuie repetată la vârsta de 3 sau 6 luni, în funcție de specie. Se vor respecta normele legale în vigoare.

Contraindicații

Nu se vaccinează animalele bolnave.

Efecte adverse

După vaccinare, uneori, pot apare reacții de hipersensibilitate. În acest caz se administrează adrenalină, subcutanat. La locul de inoculare poate să apară, uneori, un nodul palpabil cu caracter trecător.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe, în afară de vaccinurile din gama Nobivac[®] (DHP, DHPPi, Parvo-C, Tricat).

Precauții

Înainte de utilizare vaccinului va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei. Flaconul se agită pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

Perioadă de așteptare

Canide, feline, vulpi, dihori: nu este cazul.

Bovine, ecvine, ovine, caprine: lapte și carne: 0 zile.

Supradozare

Se va evita supradozarea.

Păstrare

La temperatura de 2-8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Cutie cu 10 flacoane x 1 doză.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.