

Oxitetraciclină 20%

Pudră solubilă pentru administrare orală pentru viței sugari, porci, broileri, curcani, găini ouătoare și iepuri.

Compoziția:

Substanțe active:

-Oxitetraciclină 200 mg;

Excipient:

- excipienți solubili de 1 g.

Indicații:

Viței sugari: pasteureloză, pneumonie enzootică, boli ale aparatului respirator și genital.

Porci: boli bacteriene intestinale și respiratorii.

Broileri, curcani și găini ouătoare: boli bacteriene intestinale, ale aparatului respirator și genital, septicemii bacteriene.

Iepuri: colibaciloza, salmoneloza, pasteureloza.

Contraindicații:

A nu se administra la animale care sunt sensibile la tetraciline sau la animale care suferă de disfuncții renale.

Reacții adverse:

În viței care nu mai sunt alăptați, tratamentul oral poate modifica echilibrul florei microbiale.

Specii țintă:

Viței sugari, porci, broileri, curcani, găini ouătoare și iepuri.

Posologie pentru fiecare specie, căi de administrare și mod de administrare:

Viței sugari: 12.5 – 20 g produs pentru fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 25 – 40 mg de oxitetraciclină per kg greutate corporală).

Porci: 10 – 25 g produs pentru fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 20 – 50 mg de oxitetraciclină per kg greutate corporală).

Broileri: 20 – 35 g produs pentru fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 40 – 70 mg de oxitetraciclină per kg greutate corporală).

Curcani: 20 – 35 g produs pentru fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 40 – 70 mg de oxitetraciclină per kg greutate corporală).

Găini ouătoare: 12.5 - 25 g produs pentru fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 25 - 50 mg de oxitetraciclină per kg greutate corporală).

Iepuri: 20 – 40 g produs pentru fiecare 100 kg greutate corporală (egal cu 40 – 80 mg de oxitetraciclină per kg greutate corporală).

Tratamentul poate fi prelungit până la 3 – 5 zile.

Produsul trebuie administrat prin apă de băut sau hrană lichidă, după sfatul medicului veterinar, având grijă de a nu depăși doza zilnică autorizată în mg / kg greutate corporală.

Recomandări privind administrarea corectă:

Oral, prin apa de băut sau hrana lichidă.

Timp de așteptare:

Viței sugari: 10 zile,

Porci: 18 zile,

Broileri: 8 zile,

Curcani: 12 zile,

Găini ouătoare: 5 zile (ouă),

Iepuri: 12 zile.

Precauții speciale pentru depozitare:

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra la loc uscat și răcoros.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Atenționări speciale:

Utilizarea în perioada de gestație și lactație: la iepuri, în primele faze de gestație poate provoca o creștere a reabsorbției fetale. La celelalte specii nu au fost observate efecte serioase, deși până ce acest antibiotic este gata difuzat prin placentă și este detectat în sangele fetal, membrane și țesuturi, în timpul gestației, utilizarea trebuie restricționată doar la cazuri de necesitate absolută.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Deoarece absorbția oxitetraciclinei este inhibată de ioni ai calciului și magneziului, administrarea simultană de calciu și magneziu sau produse pe baza de calciu și magneziu trebuie evitată. Dacă este posibil, utilizați hrana care nu conține aceste două elemente.

Alte informații

Valabilitate:

- perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 15 luni.

- perioada de valabilitate a soluției gata preparată este de: 12 ore.

A nu se amesteca cu hrana solidă.

Ambalaj:

- saci de 1 kg, 5 kg.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !